

# silicolgel®

## Beskytter maven

Lindrer og behandler mave-/tarmproblemer og irritable tyktarm (IBS)

## Registrering

Medicinsk-teknisk produkt, kl. 2A

## Indikation

Lindrer og behandler mave-/tarmproblemer og symptomer på irritable tyktarm (IBS) som f.eks. halsbrand, reflux, kvalme, mavepine, oppustethed og diarré.

## Indhold

**silicolgel** indeholder kiselsyre i kolloid form. Kisel er jordens næstmest forekommende element efter ilt. Det findes i naturen som kiseldioxid, samt i hydreret og vandig form som kiselsyre.

## Virkning

**silicolgel** virker hurtigt i mave og tarm.

Den gavnlige virkning af **silicolgel** fremkommer takket være kiselsyres store, aktive overflade, samt dets evne til at:

- lægge sig som en beskyttende hinde i mave og tarm.
- virke som en "magnet", der fysisk adsorberer/binder toksiner og lignende, og fjerne det fra kroppen.
- adsorbere overskydende syre og gasser, og derved reducere oppustethed/luft i maven.

## Anbefalet daglig dosis

Voksne og børn over 12 år: En spiseskefuld (15 ml) 3 gange dagligt, gerne før måltider.

Børn under 12 år: Spørg lægen til råds inden behandling med **silicolgel**.

Gelen indtages oralt - ufortyndet eller fortyndet med vand. **Ryst flasken godt inden hver brug.**

**silicolgel** bør indtages en time før eller efter indtagelse af lægemidler.

Ved **ikke-akutte gener** anbefales behandling med **silicolgel** i 4 uger efterfulgt af en pause på 4-7 dage.

Herefter kan behandling genoptages efter ovenstående intervaller.

Hvis generne ikke er aftaget efter 3 dage, bør man kontakte lægen.

## Ingredienser

3,5 g siliciumdioxid pr. 100 ml kiselsyre gel, konserveringsmiddel: sorbinsyre (E200), natriumbenzoat (E211).

## Vigtigt

- Opbevares utilgængeligt for børn
- Må ikke fryses. Opbevaring mellem 2 og 25 grader C.
- Læs indlægssedlen før brug
- Anvendes inden for 3 måneder efter åbning

## Yderligere information

[www.silicol.dk](http://www.silicol.dk)



	Apotekets varenummer	Indhold
Silicol gel	218556	200 ml
Silicol gel	215732	500 ml