

Akut förgiftning Agera snabbt och rätt

Viktig
information
till alla med
små barn!



Kolsuspension

Aktivt kol 150 mg/ml

Förgiftningar hos barn

Förgiftningstillbud bland barn är vanligast i 1–3 årsåldern, när barnet börjar undersöka sin omgivning. Olyckan kan lätt vara framme i ett obevakat ögonblick. Allvarliga förgiftningar bland barn är ovanliga. Det finns dock läkemedel och kemikalier där några få tabletter eller en enstaka klunk kan innebära risk för allvarliga symtom.

Förebygg förgiftningar

- Förvara alltid farliga saker, även barnskyddade flaskor och burkar, utom räckhåll för barn.
- Ha aldrig frätande saker som maskindiskmedel eller propplösare under diskbänken.
- Håll inte över giftiga vätskor, till exempel bensin eller fotogen, i läsk- eller saftflaskor.
- Håll uppsikt över tändvätskan vid grillning.
- Ställ undan lacknafta direkt efter målning.
- Placera inte lampor med lampolja i barnhöjd, exempelvis på soffbord.
- Ta bort giftiga krukväxter.
- Håll uppsikt över barnet utomhus – det finns både odlade och vilda växter, bär och svampar som är giftiga.
- Förvara läkemedel – även receptfria – i sina originalförpackningar i ett låsbart skåp.

Om olyckan är framme

Vid förgiftningar är det viktigt att handla snabbt och rätt. Gör man fel kan det få allvariga följder.

- Börja alltid med att ringa 112 och begär Giftinformationscentralen.
- Medicinskt kol är ofta bra att ge vid förgiftning.
- ”Eftersom det är viktigt att ge kol så snart som möjligt bör man ha det hemma.”

(www.giftinformationscentralen.se)

Hur verkar medicinskt kol?

Medicinskt kol binder till sig många ämnen, bland annat de flesta läkemedel, svamp- och växtgifter. Därmed kan man motverka att kroppen tar upp de giftiga ämnena. Kol skall ges så snabbt som möjligt, helst inom 5–10 minuter.

Marknadsundersökningar¹ visar dessvärre att det bara är 2 av 10 småbarnsfamiljer som har kol hemma.

Kolsuspension är en färdigblandad lösning som är klar att ges direkt.



Akut förgiftning

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

Agera snabbt och rätt

Ha alltid medicinskt kol hemma. OBS! Använd aldrig medicinskt kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen.

För mer allmänna råd om förgiftningar kan man ringa Giftinformationscentralen, 08-33 12 31.

Kolsuspension – färdigblandad lösning

Till barn: Ca 70 ml eller $\frac{3}{4}$ flaska.

Till vuxna: Ca 150 ml eller $1\frac{1}{2}$ flaska.

Kolsuspension (aktivt kol). Oral suspension. Vid akuta förgiftningar. Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum. Kolsuspension är överksam vid lut- och syraförgiftningar. Läkemedlet är receptfritt. För mer produktinformation och prisuppgifter se FASS.se. Läs bipacksedeln före användning. Datum för översyn av produktresumé: 2015-03-06

Referens:

1. YouGov, maj 2010

